

Родители!

Не храните лекарства и химические вещества в местах, доступных для детей. Держите их в стандартной упаковке и посуде. При кормлении ребенка грудью мать может принимать лекарства только по рекомендации и при постоянном контроле врача.

Не решайте сами вопрос о лечении заболевшего ребенка.

Только врач может назначить лекарства, в том числе и витамины: только он может решить вопрос о дозе и продолжительности лечения.

Следите, чтобы дети не ели невымытых фруктов и овощей, дикорастущие растения и ягоды.

При малейшем подозрении на прием Яда срочно проконсультируйте ребенка у медицинского работника.

Помните, что отравление у детей, как правило, является следствием нашей небрежности и халатности.

Применение в промышленности, в сельском хозяйстве и в быту разнообразных химических веществ, наличие в каждой семье различных лекарственных препаратов при несоблюдении правил их хранения создают условия для случайного отравления детей.

Острое и хроническое отравление может возникнуть у новорожденных и грудных детей при бесконтрольном применении лекарств матерью, кормящей ребенка грудью. В этом случае лекарство, выделяемое грудными железами, поступает в организм ребенка с молоком.

Наиболее часто случайные отравления возникают у детей в возрасте от 1 года до 5 лет.

Родители должны оберегать детей от возможного соприкосновения с ядом, хранить химикаты и лекарственные вещества в закрытых, не доступных для детей местах. Все вещества должны быть на строгом учете. Необходимо помнить, что отравление не всегда развивается остро. Заболевание может протекать в первые часы, а иногда и Дни незаметно или проявляться в виде слабости, сонливости, общего недомогания, жалоб на умеренные боли в животе, в последующем же

возможно развитие тяжелых осложнений, а в запущенных случаях и необратимых изменений в организме.

Во всех случаях, подозрительных на прием яда, необходимо срочно доставить ребенка в медицинское учреждение! Чем раньше доставлен ребенок, тем быстрее и легче его вывести из состояния отравления, тем благоприятнее прогноз.

По возможности надо представить врачам все рассыпанные таблетки, пустые упаковки. Важно знать все имеющиеся в доме лекарства.